



المؤسسة العامة للغذاء والدواء

معالي رئيس المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة
عطوفة أمين عام وزارة الصحة

وارد نقابة الصيادلة الأردنيين

2023-07-29

رقم الوارد ٤٨٨٣٤/٣/٥

عطوفة مدير عام الخدمات الطبية الملكية
عطوفة مدير عام دائرة المشتريات الحكومية
عطوفة مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية
عطوفة مدير عام مستشفى الملك عبدالله المؤسس الجامعي
عطوفة مدير عام مستشفى الأمير حمزة
عطوفة مدير عام مركز الحسين للسرطان
عطوفة نقيب الاطباء
عطوفة نقيب الصيادلة

السادة جمعية المستشفيات الخاصة
السادة جمعية مالكي الصيدليات الخاصة
وكالة تشغيل وغوث اللاجئين (الانوروا)

الرقم ٣١٣٤٩ / ١١١١٣
التاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٢ هـ
الموافق ٢٠٢٣/٠٧/١١ م

الموضوع : تعميم

تحية طيبة وبعد ،،،

اشارة إلى معلومات المأمونية المستجدة الخاصة بالاستخدام الأمثل والأمن للأدوية التي تقع ضمن مجموعة أدوية Opioids والمنشورة على موقع هيئة الغذاء والدواء الامريكية (US-FDA) بتاريخ 2023/04/13 حيث تشمل التحذيرات ما يلي:

- In assessing the severity of pain, discuss with the patient the impact of the pain on their ability to function and their quality of life. Assessment of pain should consider both the cause of pain and individual patient factors.
- If the patient's pain is severe enough to require an opioid pain medicine and alternative treatment options are insufficient, prescribe the lowest effective dose of an (Immediate Release-IR) opioid for the shortest duration of time to reduce the risks associated with these products.
- Reserve (Extended Release/Long Acting - ER/LA) opioid pain medicines only for severe and persistent pain that requires an extended treatment period with a daily opioid pain medicine and for which alternative treatment options are inadequate.
- For all patients prescribed opioid pain medicines, discuss the availability of naloxone, and consider prescribing it to those at increased risk of overdose.
- The symptoms of opioid-induced hyperalgesia -OIH, a condition where opioids cause an increase in pain (called hyperalgesia) or an increased sensitivity to pain (called allodynia), are distinct from opioid tolerance and withdrawal and can be difficult to recognize.
- If a patient is suspected to be experiencing OIH, carefully consider an appropriate decrease in dose of the current opioid pain medicine or safely switching them to a different opioid product, if tolerated. Advise patients about the risk of OIH and tell them to never increase the opioid dosage without first consulting a health care professional, because this could worsen the pain and increase the risk of respiratory depression.
- To report suspected adverse drug reactions:
 - email: jpc@jfda.jo
 - website: <https://primaryreporting.who-umc.org/JO>
 - Phone No: +962-6-5632000
 - QR Code:



وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

المدير العام

الاستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات

نسخة / قسم الاستخدام الرشيد - المتابعة
نسخة / قسم التسجيل
نسخة / ضابط ارتباط الموقع الالكتروني
نسخة / الفاكس

الملكية الأردنية الهاشمية

HH010-2023

هاتف: +962 6 5632000 فاكس: +962 6 5632000 ص.ب: 11901 عمان، 11181 الأردن ج.ب: 52328 أ.ب: 11973 الأردن